

Erkrankung	Inkubationszeit	Dauer der Ansteckungsfähigkeit	Wiederzulassung	Ärztliches Attest	Geschwisterkinder
Adenoviruskonjunktivitis/ Augenentzündung	5 - 12 Tage	2 Wochen	Symptomfreiheit	Stempel vom Arzt	wenn keine Symptome - kein Ausschluss
unspezifische Durchfallerkrankungen	wenige Stunden bis Tage	Solange Krankheitserreger ausgeschieden werden	24 Stunden symptomfrei bei Kindern bis 6, bei älteren Kindern kein Ausschlussgrund	nein	wenn keine Symptome - kein Ausschluss
virale und bakterielle Durchfallerkrankungen (z.B. Noro-und Rotaviren, Campylobacter, Yersinien) und bei Erkrankungshäufungen	wenige Stunden bis Tage	Solange Krankheitserreger ausgeschieden werden	48 Stunden symptomfrei bei Kindern bis 6, bei älteren Kindern kein Ausschlussgrund	nein	wenn keine Symptome - kein Ausschluss
EHEC	1 - 8 Tage	Solange Bakterien im Stuhl nachweisbar	nach Vorliegen von 3 negativen Stuhlproben	Stempel vom Arzt	Geschwister eine neg. Stuhlprobe
Hand-Mund-Fuß-Krankheit	4 - 7 Tage	über Speichel und Bläscheninhalt nur in der Akutphase, über den Stuhl einen Monat	nach Eintrocknen der Bläschen	nein	wenn keine Symptome - kein Ausschluss
Impetigo contagiosa (ansteckende Borkenflechte)	2 -10 Tage	unbehandelt bis zur Abheilung der Wunden	nach 24 Stunden erfolgreicher Therapie	Stempel vom Arzt	wenn keine Symptome - kein Ausschluss
Keuchhusten	7 - 14 Tage	unbehandelt bis 3 Wochen nach Beginn des Hustens	5 Tage nach Beginn der Antibiotikatherapie oder 3 Wochen nach Beginn des Hustens	Stempel vom Arzt	kein Ausschluss wenn kein Husten, wenn immungeschwächte Kinder in der Kita-Gruppe der Geschwisterkinder, dann sollte das Geschwisterkind Chemoprophylaxe erhalten, da es Träger der Bakterien sein kann auch wenn es geimpft ist
Kopflausbefall	existiert nicht	immer da, solange Betroffenen mit mobilen Läusen noch nicht adäquat behandelt sind	Nach 1. sachgerechter Behandlung; 2. Behandlung nach 8 - 10 Tagen erforderlich	nein, nur im Wiederholungsfall Stempel vom Arzt	wenn kein Befall kein Ausschluss sonst auch Behandlung
Ansteckungsfähige Lungentuberkulose	Wochen bis Monate	solange Bakterien im Sputum oder Magensaft nachweisbar sind	mindestens nach 3 negativen Sputumproben, nach klinischem Befund	ja	nach erfolgter Umgebungsuntersuchung durch Gesundheitsamt oder Kinderarzt
Masern	8 - 14 Tage	5 Tage vor bis 4 Tage nach Ausschlagbeginn	5 Tage nach Exanthembeginn	Stempel vom Arzt	vollständiger Impfschutz oder durchgemachte Erkrankung kein Ausschluss, sonst Impflücken schließen ansonsten 14 Tage Ausschluss
Meningokokken- Infektionen	1 - 3 Tage	bis 24 Std. nach der Antibiotikabehandlung	nach klinischer Genesung	Stempel vom Arzt	Prophylaxe mit Antibiotika für enge Haushaltskontakte und Kitagruppe, Impflücken schließen
Mumps	16 - 18 Tage	7 Tage vor bis 9 Tage nach der Beginn der Schwellung der Ohrspeicheldrüse	Symptomfrei, frühestens 5 Tage nach dem Beginn der Erkrankung	Stempel vom Arzt	Durchgemachte Erkrankung, Zulassung von Kontaktpersonen nach Impfstatus, ungeimpfte 18 Tage Ausschluss

Erkrankung	Inkubationszeit	Dauer der Ansteckungsfähigkeit	Wiederzulassung	Ärztliches Attest	Geschwisterkinder
Röteln	14 - 21 Tage	7 Tage vor bis 7 Tage nach dem Ausbruch des Exanthems	nach Abklingen der klinischen Symptome aber frühestens am 8. Tag nach Beginn des Exanthems	Stempel vom Arzt	Durchgemachte Erkrankung, Zulassung von Kontaktpersonen nach Impfstatus, Ungeimpfte 21 Tage Ausschluss, Schwangere müssen sich fern halten
Ringelröteln	7 - 21 Tage	wenn der Ausschlag auftritt nicht mehr ansteckend	kein Ausschlussgrund, da die Erkrankung in der Regel unbemerkt verläuft, Schwangere in Kitas müssen über das Risiko informiert werden	nein	kein Ausschluss
Scabies (Krätze)	2 - 5 Wochen	unbehandelt 8 Wochen	nach abgeschlossener Behandlung mit Permethrin (Creme) einmalig 8-12 Std. einwirken lassen- dann abdsuchen, nach Einnahme von Ivermectin (Tablette) 24 Std. abwarten	Stempel vom Arzt	bei Symptomfreiheit kein Ausschluss
Scharlach oder sonstige Streptococcus-pyogenes-Infektionen (Streptokokken-Angina)	1 - 3 Tage	3 Wochen unbehandelt, 24 Std. nach Antibiotikatherapie	24 Std. nach Antibiotikatherapie sonst 2 Wochen nach Beginn einer symptomatischen Erkrankung	Stempel vom Arzt	wenn keine Symptome - kein Ausschluss
Salmonellose	6 - 72 Std.	bis zu 7 Wochen Ausscheidungsdauer	bei Symptomfreiheit und nach Aufklärung durch Gesundheitsamt und Festlegung von Hygienemaßnahmen/ Aufhebung der verstärkten Hyg.-maßnahmen nach 1 Stuhlkontrolle	Stempel vom Arzt	wenn keine Symptome - kein Ausschluss
Virushepatitis A oder E	15 - 50 Tage	1 - 2 Wochen vor Ikterus (Gelbfärbung) 1 Woche nach Ikterus	2 Wochen nach Erkrankungsbeginn, 1 Woche nach Auftreten der Gelbfärbung, bei unter 1 jährigen negative Stuhlprobe	Stempel vom Arzt	Riegelungsimpfung bei Hep. A oder durchgemachter Erkrankung/Hep. E bei Symptomfreiheit
Windpocken	14 - 16 Tage, bei passiver Immunisierung 28 Tage (wird für immungeschwächte Personen empfohlen)	1 - 2 Tage vor Auftreten des Exanthems bis 5 - 7 Tage nach Exanthem	1 Woche nach Auftreten der Bläschen und deren Eintrocknen	Stempel vom Arzt	wenn Windpocken gehabt, vor 2004 geboren oder 2x geimpft kein Ausschluss, wenn nicht, dann nur wenn in der Kitagruppe keine immungeschwächten Kinder sind und keine schwangeren Erzieherinnen